

CARACTERÍSTICAS, MANEJO E IMPACTO EMOCIONAL DEL CÁNCER DE MAMA PRECOZ EN MUJERES AÑOSAS ASISTIDAS EN LA UNIDAD DOCENTE ASISTENCIAL DE MASTOLOGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS EN EL PERÍODO 2011-2018.

Natalia Camejo¹, Cecilia Castillo¹, Ana L Hernandez², Martina Abero⁴, Thais Arenas⁴, Vanira Barcena⁴, Camila Goldman⁴, González Santiago⁴, María Paz Icardo⁴, Gabriel Krigier¹.

1 Servicio de Oncología. Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela". Universidad de la República. Montevideo, Uruguay

2 Departamento de Psicología Medica, Hospital de Clínicas. "Dr. Manuel Quintela". Universidad de la República. Montevideo, Uruguay

3 Departamento Básico de Medicina, Facultad de Medicina. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay

4 Ciclo de Metodología Científica II, Facultad de Medicina, Universidad de la República, Uruguay

Introducción: Existen pocas pautas para el tratamiento del CM en pacientes añosas, lo que puede conducir al sub o sobre tratamiento. **Objetivo:** Conocer las características, manejo, evolución e impacto emocional del CM precoz en mujeres añosas. **Material y métodos:** Estudio observacional, descriptivo, transversal. Se recolectaron datos relacionados con las características clínico-patológicas y la evolución de pacientes ≥ 70 años tratadas por CM en el período comprendido entre el 1/1/ 2011 y el 31/12/ 2018. Se realizó una encuesta para valorar el impacto emocional del CM. Se utilizaron herramientas de estadística descriptiva y para calcular la supervivencia global (SVG) se utilizó el método de Kaplan-Meier. **Resultados:** se incluyeron 31 pacientes; la edad mediana al diagnóstico fue 76,8 años; las características clínico-patológicas fueron: carcinoma ductal 71%; GH 1-2: 74,2%; estadio I: 54,8 %; sin compromiso axilar: 80,6 %; HER2-RE/RP+ 80,6%; HER2 positivas 16,7%, y triple negativas 3,2%. El 29% de las pacientes fueron diagnosticadas mediante mamografía de tamizaje y el 74,2% recibieron tratamiento según pautas vigentes, mientras que el 38,7% fueron subtratadas y el 16,1% sobretratadas. La mediana de SVG fue de 98,7 meses. En el 63,1% de las pacientes el estado anímico no se vio afectado por el diagnóstico ni por el tratamiento. **Conclusiones:** Una minoría de las pacientes fue diagnosticada mediante tamizaje, el tipo histológico más frecuente fue el ductal y la prevalencia de los tumores HER2-RE/RP+ fue mayor que en las pacientes más jóvenes. La mayoría de las pacientes recibió tratamiento estandar.